Roussensko edro

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp994

Rausenso advo

Rousensko Edro
7 R 2 A - 381-385 X

Vass7R02s381-385







dontodontodontodontod

ANNEE 1992 NOM Rousensko edro EMPLACEMENT 7 R2 1 381. 385

4

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor début	raison mi/f	fin	Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
1	4	23.3	26,3 x	1	2	26.5	28.5	30.5	24.7	28.7	1.8	Q1:9 +6
2							+6			+1		+6
8	0				Grappe	: G -	м - (Р	Dim	: Z	Compa	cité:	L - M -C
4	1				Pour :	(C) (Mil		. 9	0 < 0.1		
5					Baie:			_	obov-c			
		26.3.9	2		Couleu	T				-		oloré
		+6			Saveur	-			ox - h	erb		
		,			Pépins Port :	1 ou	c - ap	yrene V:	igueur	: 3		
						r	y			7		

ANNEE 1993 NOM Roussensko Edro EMPLACEMENT 7R22-381.385 3 R2 1486-490 Bord. 54.89. Souche Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison Maturité yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 1 4 2 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C Pour : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

AMMER: 1994 EMPLACEMENT 7 R2 A381.385. NOM Roussens de édro Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Floraison Véraison début mi/t fin début mi/v fin Maturité Ferti-lité Souche 3 14.3 17.3 0 3 7.3 10.3 0 4 10.3 14.3 1 4 16.3 14.3 3 8
De M.3, 94 (+7) 3 29.5 31.5 3.6 18.7 21.7 25.7 5.9 1 2 3 Grappe: G - M - P Dim : 12 Compacité: L - 13 Pour : O Mill : O Baie: (TC)- G - M - P Dim: 30 x 18 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins avec - apyrène Port: Vigueur : ul groppellores

NOM Roussensko édro EMPLACEMENT 7 R2 s 381.385

		1	300	y	,							
ouche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v	fin	Maturit é
1 2	4 3			0	0,5		fluo	de gra	El or			
3	4			M	Grappe	: G -	м - Р	Dim :		Compac	cité:	L - 11 -C
4	Ц			P	Pour :		Mil	1:				
5	5			0	Baie:				im :	/l-fus		
	20			1	Couleur	r : B-0	Gr-Rs-I	Rg-N	Jus	: inc	- co	loré
					Saveur	: s -	m - a	r - fo	ox - he	erb		
					Pépins							
		`			Fort:	1/2	erig	Vi	gueur	: 3		
	::											

AMMEET: 1996 HOM Rousensko edro EMPLACEMENT. 7 R2 1 381.385

Bord 54.89

9.	oru o	2000												
che	Nbre yeux		mi/deb		Ferti-	Flor debut	mi/f	the same of the same of the same of		mi/v	fin	Maturillé		
1 2	4				2	gap	s coujé (vent)	20						
3 4 5	4 4	4.3 1.3	14.3 × 11.3 × 18,3.	300	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - E-C Pour: Mill: Baie: TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré									
	J) le	18.3,	3 % (72)		Saveur Pépins Fort :	: s -	m - a	r - f yrène	ox - he	erb				

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement: MXXXXXX Rousensko édio

7R2A.381-385A.1

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 } sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages brønzées ou cuivrées 196/- entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198)

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etaloes - en goutzière - autres

Face inférieure ; glabres 169 séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210)entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ême et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 2(14) - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre (20) - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 263.)

A péticle glabre 2(34) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

(alvo 91

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Roussensko édro 7R21-381-385+11

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

verte 260 - jaune 261 - rouge clair 263 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 legivert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 92

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(2)- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 -

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177) - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

- Calvo 92

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : ! Roussenske édro 1 R25-381-3850.1

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 14x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 86.

Très grosse 82 / Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :33 x 20). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme: discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 / coloré 106. A ombilic très apparent - per apparent. A section transversale : régulière 167 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 1(2 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 1 moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 / peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132 / A pinceau : coloré 133 - non coloré 134) A peau fine 135 - moyenne 136) - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 189)- molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 92

Roussensko édro 7 R20-381.3851.1

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

4

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3)

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3)

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
 Sarment
                     : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
 Ecorce
                       détachant en lames (2)
 Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3)
                                 autre (4).
                    unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
 Surface
                       duveteux (8) -cotonneux (9).
                     : entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
 Villosité
                    : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
                    : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4).
 Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 1.5.... cms.
                    : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                    : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)
                    : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
                       marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
                     violacé (7) - autre (8).
                    : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
 Yeux
                    : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).

: saillant (1) - effacé(2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

-Calvogi,

od'ordre: Roussensko edro Oésignation: 7 Rl A 381.385

```
Ingle des nervures
Sexe
                                  : (7) - 8 - 9
11/1
                                  : 10 - (11)
12/L
                                  : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Vombre de lobes
                                  : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                  : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
                                 : 266
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                   : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                  : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                   : 271
                                   : (40) - 41
Dents : forme
                                   : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                   : 45 - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                  : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                   : 63 - (64) - (65) - 66 - 67
 Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 93